

Comment obtenir un dépistage du premier trimestre optimisé (DPTO)

Le DPTO (anglais: eFTS) est un test de dépistage prénatal optionnel qui peut vous indiquer la probabilité d'avoir un bébé atteint de la trisomie 21 (syndrome de Down) ou de la trisomie 18 (syndrome d'Edwards). Le dépistage du DPTO nécessite une échographie de la clarté nucale (CN) ainsi qu'une analyse sanguine lors du premier trimestre de votre grossesse.



1

Trouver des endroits qui offrent des échographies de la CN

Votre prestataire de soins peut vous référer à un hôpital ou une clinique pour votre échographie de la CN. Si nécessaire, vous pouvez consulter [la carte interactive](#) de notre site web pour localiser un centre.

2

Prendre rendez-vous pour l'échographie de la CN

L'échographie de la CN est effectuée entre 11 semaines et 2 jours jusqu'à 13 semaines et 3 jours de grossesse. Pour choisir correctement le moment de l'échographie on doit absolument connaître votre âge gestationnel. L'échographie de la CN sera organisée par vous ou par votre prestataire de soins.

3

Se présenter à l'échographie de la CN

Une section de la [Demande de Dépistage Multimarqueurs](#) sera remplie directement au département d'échographie. Vous devez obtenir cette requête d'examen pour votre prise de sang.

4

Passer une analyse sanguine

Bien que la collecte de sang le jour même soit préférable, elle n'est pas essentielle. L'analyse de sang peut être effectuée à tout moment après l'échographie, jusqu'à environ 13 semaines et 3 jours de grossesse. Apportez la demande de dépistage prénatal à un laboratoire de collecte de sang, tel que LifeLabs® ou Dynacare®.

5

Obtenir les résultats

Les résultats seront envoyés à votre prestataire de soins dans un délai de 5 jours ouvrables. Il est important de lui demander comment on vous les transmettra.

COMMENT OBTENIR PLUS D'INFORMATION?



www.PrenatalScreeningOntario.ca



PSO@BORNOntario.ca



1-833-351-6490 (sans frais)
ou 613-737-2281